



पछाडिको भाग र थुन वरिपरि गिर्खा देखिएको

फार्मको सुरक्षा कसरी गर्ने ?

- खोप लगाएर- प्रभावकारी खोप लगाएको तीन हप्ता भित्रमा रोग विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुन्छ।
 - संक्रमित हुनु अघि नै गाईभैंसीलाई खोप लगाउनु पर्छ।
 - खोपले कहिलेकाहीं केही गाईभैंसीमा निम्न अनुसारका प्रतिक्रियाहरू देखाउन सक्छः
 - खोप लगाएको ठाउँमा हलुका सुन्निन्छ, जुन १-२ हप्ता भित्रमा आफै हराएर जान्छ।
 - छोटो समयको लागि ज्वरो आउनुका साथै केही दिन दूध उत्पादन घट्न सक्दछ।
 - शरीर वा थुनमा साना गिर्खाहरू देखिन सक्छ जुन छिट्टै हराउँदछन्।
- विश्वसनीय स्रोतहरूबाट गाईभैंसी खरिद गर्नुपर्दछ। गाईभैंसी खरिद गरी ल्याएमा २८ दिनसम्म बथानबाट अलग्गै राख्नुपर्दछ। रोगको प्रकोपको समय रोग लागेको ठाउँबाट गाईभैंसी ल्याउनु हुँदैन।

- गोठलाई झिंगा, लामखुट्टे तथा अन्य किराहरूबाट मुक्त राख्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्दछ र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कीट विकर्षकको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
- गोठ वरिपरि पानी जम्न दिनु हुँदैन।
- फार्ममा जैविक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

थप जानकारीका लागि

पशु सेवा विभाग, हरिहरभवन

फोन नं: ०१-५५२१६१०, ०१-५५२५४७८, ०१-५५२२०५६


वेब: www.dls.gov.np



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी



किसानको लागि

परिचय

- यो रोग गाईभैंसीमा देखिन्छ।
- यो रोग मानिसहरूमा सँदेन।
- गर्मी मौसममा टोक्ने झिंगा (डाँस), लामखुट्टे, किर्ना जस्ता किराहरूको संख्या बढी तथा थप सक्रिय हुने हुनाले यस रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ।
- दूध उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउँदछ।
- प्रजनन समस्या आउने तथा गर्भपतन हुन सक्दछ।
- भैंसीको छालाको गुणस्तरमा हास आउँदछ।
- वजन घट्ने र कहिलेकाहीं मृत्यु समेत हुन सक्दछ।
- गाईभैंसीहरूको ओसारपसार तथा व्यापारमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने हुँदा थप आर्थिक नोक्सानी हुने गर्दछ।



शरीरभरि गिर्खा देखिएको गाई

रोग सन्ने तरिका

- लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाइबाट,
- संक्रमित गाईवस्तुहरूको ओसारपसारबाट,
- सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा दाना तथा पानी खाने ठाउँहरूबाट,

- प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भाधानबाट,
- पशु उपचार गर्ने क्रममा फरक गाईभैंसीहरूमा एउटै सुइको प्रयोगबाट,
- कहिलेकाहीं प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट

लक्षणहरू

संक्रमित गाईभैंसीले निम्न अनुसारका लक्षणहरू देखाउँदछन्:

- उच्च ज्वरो (१०४ डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि), दाना पानी कम खाने र दूध उत्पादन घट्दछ।
- छालामा १-५ सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खाहरू (सामान्यतया सुरुमा टाउको र घाँटीमा) देखिन्छ। लामो रौं भएको गाईभैंसीमा गिर्खाहरू सजिलै देखिदैनन्। जिउ छाम्दा तथा पानीले भिजेको अवस्थामा मात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ।
- सामान्य संक्रमणमा गिर्खाहरूको संख्या थोरै र गम्भीर संक्रमणहरूमा पूरै शरीर ढाक्ने गरी हुन सक्दछ।
- गिर्खाहरू केही समयपछि हराउन सक्छन् तर कहिलेकाहीं गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ भई किरा तथा झिंगाहरूले (औसा) घाउलाई थप जटिल बनाउन सक्दछन्।
- थुतुनो, मुख र नाकभित्र घाउ देखिन्छन्।



भैंसीको शरीरभरि साना साना गिर्खाहरू देखिएको



गिर्खा फुटेपछिको घाउँ

- आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउछ।
- न्याल काढ्छ।
- लिम्फ नोडहरू सुत्रिने हुन्छ।
- केही संक्रमित गाईभैंसीहरूले कुनै पनि लक्षण नदेखाउन सक्छन्।

उपचार

यो रोगको प्रभावकारी उपचार छैन। रोग लाग्न नदिनुनै उत्तम उपाय हो।

रोगको शंका लागेमा के गर्ने ?

गाईभैंसीहरूको नियमित निरीक्षण गर्नुहोस् र पशुहरूमा रोग लागेको शंका भएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुहोस्।

- रोगको प्रकोपको समयमा वा जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पर्ने गाईभैंसीहरूको दैनिक निरीक्षण गर्नु पर्छ।
- पशुहरूलाई रोग लागेको शंका भएमा तुरुन्त प्राविधिक, स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी दिनुहोस्।
- लम्पी स्किन रोग भएको अवस्थामा पशुहरूको ओसारपसार तुरुन्त रोक्नु पर्छ।